

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百七十六

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱炘

謄錄監生臣趙廷麒

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十六 明

周王朱橚 撰

嬰孩一切癰門

總論

論曰少小所有癰病及瘰癧者皆因臟氣不平故也
新生即癰者是其五臟不收血氣不聚五脉不流骨怯
不成也多不全育其一月四十日已上至晷歲而癰者
亦由乳養失理血氣不和風邪所中也病先身熱掣瘓

驚啼叫喚而後發癰脉浮者為陽癰病在六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沉者為陰癰病在五臟骨髓極難治也病發身軟時醒者謂之癰也身強直反張如角弓不時醒者謂之瘖也諸反張大人脊下容側手小兒容三指者不可復治也凡脉浮之與脉沉以判其病之陰陽表裏耳其浮沉復有大小滑澁虛實遲速諸證各依脉判為治神農本草經說小兒驚癰有一百二十種其證候微異於常便有是

癰候也初出時血脉不斂五臟未成稍將養失宜即為病也時不成人其經變蒸之後其餘病證並寬惟中風最暴卒也小兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癰及變蒸者日滿不解者並宜與龍膽湯凡小兒之癰有三種有風癰有驚癰有食癰凡是先寒後熱發者皆是癰也驚癰皆按圖灸之風癰當與猪心湯食癰當下乃俞紫丸佳小兒所得風癰者緣衣暖汗出風因入也風癰者初得之時先屈指如數乃發作者此風癰也驚癰者起

於驚怖人啼乃發作者此驚癇也驚癇微者急治之勿復更驚之或自止也其先不哺乳吐而變熱後發癇者此食癇早下則瘥四味紫丸逐癖飲最良去病速而不虛人亦丸

即癖結脹滿中
八味紫霜丸

差駝病重者當用之凡小兒

不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無所損及其初發時病尚未深若不時下則成大疾疾成則難治矣凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾若四味紫丸不得下者當以赤丸下

之赤丸不下者當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍服之并摩赤膏風癇亦當下之然當以猪心湯下之驚癇但按圖灸之及摩生膏不可大下也何

者驚癇心氣不定

一作足

下之內虛益令甚爾驚癇甚者

特為難治故養小兒常慎驚勿令聞大聲抱持之間當安徐勿令驚怖又天雷時當塞兒耳作餘細聲以亂之也凡養小兒皆微驚以長其血脉但不欲大驚大驚乃灸驚脉若五六十日灸者驚復更甚生百日後灸驚脉

乃善兒有熱不欲哺乳卧不安又數驚此癇之初也服紫丸使愈不愈復與之兒眠時小驚者一月輒一以紫丸下之減其盛氣令兒不病癇也兒立夏後有病治之慎勿妄灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏摩之又以膏塗臍中令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之小兒衣甚薄則腹中乳食不消不消則大便皆醋臭此欲為癇之漸也便將紫丸以微消之服法先從少起常令大便稀後便漸減之不醋臭乃止藥也凡

小兒冬月下無所畏夏月下難瘥然有病者不可不下
下後腹中當小脹滿故節乳哺數日不可妄下又乳哺
小兒當令多少有常劑兒漸大當稍稍增之若減少者
此腹中已有小不調也使微服藥勿復哺之但當與乳
甚者十許日微者五六日止哺自當如常若都不肯食
哺而但欲乳者此是有癖為疾重要當下之不可不下
不下則致寒熱或吐而發癰或更致下痢此皆病重不
早下之所為也此即難治矣但先治其輕時不耗損而

病可愈凡小兒屎黃而臭者此腹中有伏熱宜微將服
龍膽湯若白而醋臭者此挾宿寒不消也當服紫九微
者少與藥令內消甚者小增藥令小下皆復節乳哺數
日令胃氣平和若不節乳哺則病易復復下之則傷其
胃氣令復脹滿再三下之尚可過則傷矣凡小兒有癖
其脉大必發癰此為食癰下之便愈當審候掌中與三
指脉不可令起而不時下致於發癰則難療矣若早下
之此脉終不起也脉在掌中尚可早療若至指則病增

矣凡小兒腹中有疾生則身寒熱寒熱則血脉動動則心不定心不定則易驚癇發速也

候癇法

夫癇小兒之惡病也或有不及求醫而致困也然氣發於內必先有候常宜審察其精神而採其候也

手白肉魚際脉黑者是癇候魚際赤者熱脉青大者寒脉青細者為平也○鼻口乾燥大小便不利是癇候○眼不明上視喜陽是癇候○耳後完骨上有絡盛

卧不靜是癇候青脉刺之令血出也○鼻口青時小驚
是癇候○目閉青時小驚是癇候○身熱頭常汗出
是癇候○身熱吐衄而喘是癇候○身熱目直視是
癇候○喜欠目上視是癇候○身熱目視不精是癇候
○目瞳子卒大黑於常是癇候○卧惕惕然而驚手
足振搖是癇候○卧夢笑手足動搖是癇候○意氣
下而妄怒是癇候○咽乳不利是癇候○身熱小便
難是癇候○吐衄不止厥痛時起是癇候○弄舌搖

頭是癇候。○小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癇候已上諸候二十餘條皆癇之初也。見其候便爪其陽脉所應灸爪之皆重手令兒驟。○及足絕脉亦依方與湯。瞳子直視動轉腹滿瀉下血身熱口噤不食乳角弓反張強汗出發熱嗜卧不悟手足掣癡喜驚凡八條癇之極者也。如有此非復湯爪所能救。便當時灸之。若病家始發便來請師師可診候當審其發作次序治之以其節度首尾取瘥也。病家已經無次序不能制病病又變異。

其本候後師更不知其前症虛實祇據後症求治亦不得
瘥也要須盡問察之道前師診治源流當倣其意以為
治乃無逆耳前師處湯本應數劑乃瘥而病家服一兩
劑未效便謂不驗矣已後更問他師不尋前人後人不
知次序而更為治盡反前師此治之弊也或前已下之
後又當以和平之劑接補之或有症應下而前未下者
或前治寒溫失度後人調治是為治敗病皆須的確然
後無誤不依次第及不審察必重弊也錢氏云廣親太

尉七歲潮熱數日欲愈錢謂其父三大王曰七使潮熱
將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿言八使病
錢曰八使過來日午間即無苦也次日午前果作急搐
召錢治之三日愈蓋預見其目直視而顙赤必肝心俱熱
更坐石枕子乃欲冷此熱甚也肌膚素肥盛脉又急促
故必驚搐所言午時者自寅至午皆心肝所用事時治
之瀉心肝補腎自安矣東都王氏子吐瀉諸醫用藥下
之至虛變慢驚其候睡露睛手足瘳癢而身冷錢曰此

慢驚也與括萎湯其子胃氣實即目開而身溫王疑其子不大小便令諸醫以藥利之醫用王不留散等數服不利而身復冷令錢氏利小便錢曰不當利小便利之必身冷一二日已身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中虛若利大小便即死久則脾腎俱虛當身冷而目閉幸胎氣實而難衰也錢用益廣散使君子丸四服令微飲食至日午果能食所以然者謂利大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻也後又不語醫作失音治之錢曰既失音豈

開目而能飲食又牙不噤而口不緊也諸醫不能曉錢
以地黄補腎所以然者用清藥利小便致脾腎俱虛今
脾已實腎尚虛故補腎必安治之半月而能言一月而
痊也○吐虛者慢驚風瀉虛者慢脾風吐瀉虛者曰陰
癇壯熱搐掣曰陽癇慢驚風眼偏喜開慢脾風眼偏喜閉
陰癇眼半開半閉陽癇半鮮半青急驚風十生一死慢
驚風十死一生○風癇者因將養失度血氣不和或厚
衣汗出腠理開舒風邪入名之曰風癇其病在肝肝主

風驗其證目青面紅發搐是也驅風膏大青膏琥珀散
鎮驚藥有熱四順飲退後與利驚丸下涎驚癇者因血
氣盛實臟腑生熱或驚怖大啼精神傷動外邪所入名
其症曰驚癇其病在心心主驚驗其證忽然叫聲發搐
是也琥珀散紅龍散鎮心丸有熱四順飲利驚丸下之
食癇者因乳食過多傷動脾與胃或食停中脘内生痰
熱氣逆上衝名其症曰食癇其病在脾脾納食驗其証
愛吐氣即發搐是也此病或大便酸臭紫霜丸下之以

驚藥其食癰遇傷飽復作宜下三證大同小異並屬陽也各目睛鮮斜手足潮搐或作猪聲發過即瘥皆十生一死也所以陽癰眼半鮮半青者是肝有風熱飛仙論云目鮮則肝有風錢氏云目青者肝有熱大抵陽癰欲發先眼目青鮮其間有因驚食交互致熱盛則生風風屬於肝肝有風則旺於心火心火盛則鎔動肺金生痰壅或聞大聲或大驚而發搐者有熱極雖不聞聲及驚亦自發搐蓋風熱盛故也○慢驚者因久吐而胃氣先

虛胃與肺母子也母虛亦令子衰二經虛則生黏痰者
脾胃所出也痰則凝滯在於咽喉如牽鋸之聲時復瘕
瘕是也所以慢驚風偏喜開者胃虛生風通真子云風
能動能開慢脾者因久瀉而脾氣先虛脾與肺子母也
母虛亦令子衰二經俱虛則生頑涎者脾肺所出也涎
則溢流於咽喉如水雞之聲時復瘕瘕是也所謂慢脾
之風眼偏喜開者驚氣入脾通真子云氣能靜能閉陰
癇吐瀉之久脾胃俱虛脾與胃表裏也二經俱虛則生

痰頑涎相纏如膠塞於咽喉故聲鳴而喘時復手足顫
搖或如角弓之反張是也所以陰癇眼半開半閉者是
風氣並行脾胃○三證似同而異並屬陰也各目睛昏
暈背脊強直或作鴉聲發頻難差皆十死一生也凡慢
有汗多死仲景云不得有汗蓋陰證無汗有汗者亡陽
古人說慢驚癎瘕是似搐不搐其間亦有慢驚如急搐
者是死期之速也有嗽變驚者詳審治之○身熱脉浮
精神恍惚或吐或瀉不思飲食發搐即是半陽半陰合

病身涼脉沉精神倦怠不吐不瀉又能乳食發搐者亦是半陰半陽合病正是傷寒半是表半是裏之義也○陰癇瘥後復發多死設有安者必須眼目少精神語言不正或口有痰涎流溢頤下或手足偏廢陽癇瘥後復多涎緣驚風有三種所作忽發癇狂失治風涎流滯心包絡間或因驚而再發或感風而發或傷食而發過如舊或進退不定潮作有時也○夫癲狂癇瘥始本於心心者精神之舍智意之源常欲安靜無諸觸犯疾何

及焉若邪積於內熱搏於外脾胃因虛不能剋制腎水上刑於心火陰陽併居遂致精神失守恍惚多驚癲狂癰瘰之疾所由而生蓋重陰則癲重陽則狂癰則身軟而醒瘰則身強而昏癲之來也發則異常或歌或哭乍喜乍悲狂之證也妄言不食而歌棄衣而走癰者發則卧地嚼舌吐沫或作猪聲瘰則腰背仰折狀如反弓痰壅而厥良由風涎流滯心絡故也已而失治損傷於心心傷則神去神去則死也設有安者則語澁少神或緩

弱為廢人○小兒驚啼睡中四肢掣動變蒸未解慎勿針灸爪之也動其百脉因驚成癇也唯陰癇噤瘳可針灸之爾○凡小兒如有小疾早為尋醫勿致稽遲皆能害命凡有數疾灸而不治盡變為癇壯熱灸不治為癇夾驚傷不瘥為癇痰飲不瘥為癇洞泄不止為癇咳嗽不止為癇夜啼不瘥為癇客忤發不止為癇霍亂吐瀉不止為癇覓乳不瘥為癇臍瘡不乾常有黃水出灸則為癇已上病狀皆能變為癇疾也○小兒驚不醫者成

風風不醫者成癰癰不醫者成瘰既成瘰則難以用藥
癰亦分數種有驚風癰因驚即發有乳風癰食乳衝肺
即發發即吐乳不食有肝風癰四季多發發即寒熱口噤
有肺風癰冬月多發發即口噤面黑大抵癰病不能害
命只邪氣在心頭重嘔吐常服鎮心湯藥如覺發時一
邊手足動當吐吐後覺麻痺不能舉手兼說話亦不
分曉牙齒皆黑此風涎及邪氣閉塞竅內也凡諸癰止
發手足掣縮慎勿捉持之致令曲戾不隨也凡癰病有

數般不可盡述且說五臟表裏受風形狀初受驚癇目反視踞坐舉頭唇皮青色面青黃此乃病傳於肝若唇黑眼慢旬日死風癇口吐白沫已傳受心臟放齒咬人或即口頰手指青黑似醒似寐若指黑色面青黑乃五日內死臍風發癇面虛腫搐搦手足搖動兩臉白病已傳肺面如土色七日而死搐搦或夢中啼哭下齒咬人不似慢驚狀若眉帶黑色病傳入腎腎已絕旬日死脾癇之狀喉如鋸鳴多睡不進乳口乾唇赤眼白多此病

旦夕而死肝癰之為病青目反視手足搖心癰之為病
面赤心下有熱短氣息微數脾癰之為病面黃腹大喜
痢肺癰之為病面目白口沫出腎癰之為病面黑目正
直視不搖如尸狀膈癰之為病目反四肢不舉腸癰之
為病張口搖頭馬鳴欲反折牛癰之為病目正直視腹
脹羊癰之為病喜揚目吐舌猪癰之為病喜吐沫犬癰
之為病手屈拳攣鷄癰之為病搖頭反折喜驚自搖又
有烏癰唇口撮聚目手俱搖蛇癰身軟頭舉吐舌視人

牛癰即牛聲馬癰即馬嘶狗癰即犬吠羊癰即羊鳴雞
癰即雞鳴五癰病者腑臟相引邪氣盈起寒厥口吐沫
須臾如甦復作神效雄黃丸方與錢氏五色丸同但博
濟水銀用八分耳○玄中記曰天下有女鳥一名姑獲
又名鈎鬼星也喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里呼得
來也是鳥純雌無雄不產喜落毛羽於中庭置入兒衣
中便使兒作癰必死即化為其鬼也是以小兒生至十
歲衣裳不可露也八月尤忌之○癰有八候前曰仆後

曰僵晝曰陽夜曰陰罵人曰癩笑人曰邪一日十數次
發曰癩小年有此患曰呆○蓋陽證不可用溫陰證不
可用寒風癩則先為之散風驚癩則先為之利驚食癩
則先為之消積總以定癩等劑主之若臟腑一陰一
陽是固不可無別大緊血滯心竅邪氣在心積驚成癩
通行心經調平心血順氣豁痰又其要也若見小兒有
熱有痰不欲乳哺眠睡不安常驚悸此皆發癩之漸也
即以紫霜丸導之時間量與紫霜丸減其盛氣則無驚

癰風癰內癰之患癰瘡不能言者南星炮為末雄豬膽汁調和少許啖之輒效錢氏五癰丸并南星散以菖蒲湯調下甘遂豬心湯以和蘇合香丸皆治癰之要藥也

一切癰

方

返寬丹

和濟方

治小兒諸風癰癰潮熱發瘰癧口眼相

引項背強直牙關緊急目睛上視及諸病久虛變生虛風多睡昏困荏苒不解速宜服之

當歸

酒浸切
焙微炒

烏犀

銹各
二兩

乾薑

焙

枳殼

去穢
炒

白朮

酒浸一
宿微炒

人參

去
蘆

木香

不見
火

茯苓

去
皮

丁香

不見
火

厚朴

去皮薑
汁炙熟

藁本

去
土

天竺黃

細
研

桑螵蛸

微
炒

敗龜

酒醋塗
炙黃

蔓荊子

去
白

何首烏

酒浸一宿
煮過火焙

白芷

虎骨

酒浸炙
令黃

晚蠶蛾

微
炒

縮砂仁

各三
分

麻黃

去根
節

麝香

研

羌活

去
蘆

羚羊角

銹各
一兩

半夏

湯洗七次薑汁浸
三宿焙乾炒黃

川烏頭

燒令通紅勿令烟盡入
地坑以新土圍食頃

白花蛇

酒浸一宿炙令
熟去皮骨用肉

防風

去蘆

白殭蠶

去絲嘴微炒

檳榔

白附子

微炮

天南星

湯洗生薑自然汁煮軟切焙炒黃

藿香葉

去土

阿膠

碎炒

萆薢

微炙

肉桂

去麁皮

細辛

去苗

陳皮

去穰微炒

槐

膠

烏蛇

酒浸一宿炙熟取肉用

沉香

不見火

乾蝎

微炙

獨活

去苗

天麻

酒浸切焙各一兩

硃砂

細研水飛

石斛

去根

雄黃

細研水飛

肉豆蔻

去殼微炒

牛黃

別研

龍腦

別研

水銀

附子

水浸後炮去皮臍

蟬殼

去土微炒

川芎

各半兩

烏鴉

一箇去嘴翅足

臍粉

別研一分

狐肝

三具臘月採取同烏鴉一箇入

新爇肉以瓦盆蓋頭泥固濟炭火一
觔燒令通赤烟盡出候冷研細用

硫黃

研細用

蓋盛慢火養成汁入水銀急
炒如青泥成沙再研半兩

金箔

二十片為衣

右如法修事搗研令細煉白蜜合和入酥再搗三五
千下丸如梧桐子大每一歲兒一丸溫薄荷自然汁
化下不計時候

丹砂丸

一名虎睛
丸聖惠方

治小兒一歲至十歲發癇成癲發

動無時口吐白沫遺失大小便

丹砂

研

天麻

露蜂房

微炙

麻黃

去節

黃芩

去黑

心 釣藤 各半 兩

甘草 炙 剉

防葵 炒

大黃 炒

蚱蟬

去頭 足炙

龍齒

研

山梔子

各一 兩

銀箔

十片 細研

虎睛

研一 對

羌活

去蘆 頭

柴胡

去苗

白鮮皮

升

麻

雷丸

炒

沙參

各三 分

石膏

研一 分 兩

蛇蛻

皮

炙黃

麝香

研

細辛

去苗 葉

牛黃

研各 一分

右搗研為末煉蜜為丸如棗豆大每服一歲兒三丸
二歲至三歲五丸四歲至五歲七丸六歲至十歲十
丸並用米飲下空心午間臨卧各一服一方無細辛

大金箔丸

新書 幼幼

治一切風及大人小兒諸癰解心胃

壅熱消痰墜涎無時發動吐涎沫背強直神志昏憤

金銀箔

各一百片

辰砂

一兩 研

牛黃

研

生犀

末

丁香

沉香

真珠

末

木香

腦麝

各一分

琥

珀

末

礞砂

烏蛇肉

酒浸炙 去皮骨

天麻

酒炙 浸

雄

黃

研

蝎梢

白僵蠶

附子

炮去 皮臍

天南星

炮

防風

白附子

甘草

炙已上 各一分

香墨

半兩 燒

右為細末入研藥一處勻合將金銀箔入水銀三分

同研如泥再同研令勻煉蜜為丸如菰豆大每服大人五丸用薄荷酒下小兒三丸薄荷湯化下

天烏散

一名孤肝散
幼幼新書

治大人小兒一切風及久癩患病

臘月烏鷄

一隻去毛羽
嘴爪腸胃

臘月野狐肝

一具同前
烏鷄入瓶

子內固齊
燒為灰

麝香

研

天麻

犀角

屑各
半兩

乾蝎

白殭蠶

蟬殼

牛黃

研更炙
益妙

荊芥

穗取

藿香

天南星

去心

白附子

膩粉

研

桑螵蛸

須用臘
月採取

桑上者佳
各一兩

烏蛇

二兩酒浸
炙去皮骨

右為末每服半錢煎荊芥湯或豆淋酒調下空心小兒用薄荷湯調下

奪魂散

永類
鈐方

定癇良方

白殭蠶

去絲炒令
黃色半兩

白附子

炮

蛇含石

燒紅醋
淬七八

次研
各一分

生銀

生金

白茯苓

牛黃

如無以
膽製倍

加用
之

烏梢蛇頭

七八寸
許酒煮

天麻

各一
錢

天南星

秤末一分生薑
汁浸一宿用

腦子

半夏末

二錢重薑汁
浸一宿各焙

赤脚蜈蚣

一條酒浸
炙令焦

犀角

錢二

右為末蒸棗肉為丸如麻子大每服十九至十五丸
二十九煎金銀薄荷湯下硃砂為衣一方加代赭石
一分醋淬如欲利痰加巴霜煮枳殼一分○議曰癰
之為疾又是一種證候若言驚風所傳古人有謂食
風驚三癰若言不干驚風所傳古云驚風三發便為
癰且癰為疾痰熱壅盛傳入經絡塞於心肺是致關
竅不通故作癰疾發作有如驚風吊或因驚而生痰
多或因熱而作風盛大小便不利上下氣不通心神

悶氣亂若死而復生生而復死沉沉默默無由甦省
忽爾氣透關竅漸得開通魂魄稍得安定向後心被
觸惱氣不宣利發作如前是知癰之為疾乃由虛痰
冷涎頑結於胃臆驚風併聚於關膈常無精神心志
不寧即存恍惚療理不專藥服不投必自致害何足
怪者即奪魂散方經效祕傳修合如法活人神驗豈
非至寶之謂也

麻黃五癰湯

幼幼新書

主療百日及過百日兒癰連發不

醒及胎中帶風體冷面青反張宜服

麻黃

去節二分 嬰
孺方用一分

羌活

乾葛

甘草

炙二分
嬰孺方

一分

枳實

麵炒二分 嬰
孺方用三分

杏仁

二十枚 去皮碎
并夾嬰孺方用

四十
枝

升麻

黃芩

大黃

各四分

柴胡

芍藥

各三
分

釣藤皮

一分 嬰孺方
用一分半

蛇蛻

三分 炙 嬰孺
方用二分

蚱蟬

二枚 炙
去足羽

石膏

六分
研

右以水二升并竹瀝五合煎取六合每服一合佳

五癰湯

幼幼
新書

治五六歲兒壯熱發癰疹自下利

大黃

剉炒

石膏

研各一兩

蚱蟬

三枚微炙

柴胡

去苗

升

麻 梔子仁

麻黃

去節

黃芩

知母

焙

釣藤

芍藥

杏仁

去皮尖雙仁別研各半兩

蛇蛻

三寸炙黃

露蜂房

微炙一分

右麤搗篩一二歲兒每一錢水半小盞煎至三分入

竹瀝半合更煎一兩沸去滓分溫三服至夜服盡隨

兒大小加減一方無黃芩服藥後如人肌暖以帛拭

身

石室紫藥神丸

切切新書

治小兒十二癩

丹砂

九分
別研

大黃

六分

桂心

半夏

洗各
四分

牛黃

黃連

各五
分

雲母

七分

雄黃

二分

特生礬石

十二
分煉

右為末更入

巴豆

二分去
心炒

雷丸

二分

真珠

一分

代赭

二分

乾

薑

三分

右各為末新絹袋盛蒸如斛米熟方取牛黃桂薑代赭別為末與前相和勻以蜜杵丸如黍米大一歲兒

下一九十歲小豆大一九日服三次

麻黃散

聖惠方

治小兒百日内發癰連發不醒及胎中

帶風體冷面青身體反張

麻黃

一分去根節

甘草

一分炙微赤剉

羌活

三分

柴胡

一分

去苗

川大黃

一兩剉碎微炒

川升麻

子芩

各一兩

枳

殼

麥炒炙微黃

葛根

各半兩剉

蛇蛻皮

五寸炙令黃色

石膏

一兩半細研

釣藤

一分

蚱蟬

三七枚微炙

杏仁

半兩湯浸去皮

夾雙仁麥炒微黃

右件藥搗麤羅為散每一錢以水一小盞煎至五分

去滓更入竹瀝半合煎三兩沸量兒大小加減服之

石膏散

聖惠方

治小兒一歲至四歲壯熱大驚發癇

石膏

一兩
細研

蚱蟬

二枚
微炙

柴胡

一兩半
去苗

川升麻

釣藤

各三分

子芩

各一兩

知母

各一兩

梔子仁

半兩

龍

齒

一兩

赤芍藥

半兩

麻黃

三分
根節去

葛根

一兩
剉

甘草

一分
炙微赤剉

川大黃

一兩
碎炒

右煎一兩沸量兒大小加減溫服一方無赤芍藥有

蛇蛻皮灸用

石膏崇命湯

幼幼新書

治小兒發癰

石膏

研

黃芩

去黑心

芍藥

各一分

桂心

去皮

細

辛

去苗葉

龍骨

碎

當歸

切焙

乾薑

炮

大黃

剉炒

牡蠣

煨研

赤石脂

白石脂

各三分

甘草

炙一兩

右搗篩一二歲兒每服半錢水半盞入棗一枚擘同

煎至三分去滓溫服至夜三四服隨兒大小增減一

方無白石脂若有熱有驚加黃芩二分以韋囊盛藥

大驗

蚱蟬丸 治小兒諸癇乍發

蚱蟬

炙去翅足一枚

大黃

剉

石膏

研

柴胡

去苗各一兩

牛黃

研

龍齒

碎

梔子仁

升麻

芍藥

沙

參

釣藤

各三分

杏仁

二十一枚湯浸去皮小雙仁麴炒

龍膽

半兩

丹砂

研一兩半

右搗研為末煉蜜和丸如梧桐子大一歲每服一丸溫水化破服日三更量兒大小以意加減旋丸與服

芍藥湯

幼幼新書

治小兒諸癰吐痢寒熱百病不乳哺

芍藥

黃芩

去黑皮心

大黃

炒

當歸

切焙

括樓根

甘草

炙剉

桂心

去粗皮

人參

各三兩半

赤石脂

搗研如粉

牡蠣

研如粉

紫石英

搗研如粉

麻黃

去節各一兩一分

右搗篩再研令勻一二歲兒每服半錢七水半盞入

棗一枚煎至三分去滓溫服日三服隨兒大小增減

牛黃煎 治小兒膈上有痰發癰掣癇

牛黃

研半錢

人參

半兩

生犀末

蓬砂

研

白茯苓

苓

去皮

薄荷

乳香

研

甘草

炙剉

井泉石

研

烏金石

研

生乾地黄

天麻

各一分

右搗研為末用蜜于銀器內熬成煎每服皂子大人

參湯化下日三

驅癰散 治諸癰口眼相引上視涎流手足抽掣頭項

反張腰背強直

硃砂

研

雄黃

研

蛇皮

炙黃

石膏

煨通紅出火毒各一分

蜂房

炒

遠志

取肉薑製焙

細辛

去苗

麻黃

去節

殭

蠶炒

川大黃

生

川芎

獨活

各一分半

右為末每一錢鈎藤入水蜜煎湯溫和調灌大兒增
用

竹瀝湯 治小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護
小瘡復發五月中忽小小咳嗽微溫治之因變癰
一日二十過發四肢縮動背脊反張須臾氣絕良
久復甦已與常治癰湯得其吐下經日少間爾後單
與竹瀝汁稍進一日一夕中合進一升許發時小踈

明日與此竹瀝湯得吐下發便大減其間猶稍與竹瀝汁竹瀝湯方

竹瀝

五合

黃芩

三十銖

羚羊角

銖

木防已

各六銖

大黃

二兩

茵芋

三銖

麻黃

去根節

白薇

桑寄生

萆薢

甘草

炙各半兩

白朮

炮六銖一方作白藟

右咬咀以水二升煮取藥減半內竹瀝煎取一升分服二合相去一食久進一服一方內無萆薢白朮有白鮮皮

牛黃丸

聖惠方

治小兒諸癇驚惕掣癎及中客忤宜服

牛黃

細研

人參

防風

各去蘆頭

細辛

赤芍藥

菰蔞根

當歸

已上各半兩

蚱蟬

七枚去翅足微炙嬰孺方二分

川大黃

一兩剉碎微炒

蛇蛻皮

炙令黃色五寸嬰孺三分

甘草

三分

炙微赤剉

麝香

一分細研嬰孺方用三分

巴豆

三十枚去皮心研如膏

右為末入巴豆研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如麻子大初生一月至百日兒每服一九一歲至三歲服兩九四歲至五歲兒服三九用薄荷湯下快利為度

若兒驚惕及人中溫壯熱腹滿有不調增服快利為
度量兒大小虛實與服一方加熊膽

鎮心丸

幼幼新書

治小兒癇時時發作將成厥

人參

桂心

蜀椒

茯苓

附子

炮各三分

乾薑

半夏

細辛

牛黃

各二分

桔梗

十分

白薇

防

葵

右為末蜜丸小豆大先食服五歲六歲三九日三往
來寒熱及虛熱者可作知母丸若胃上氣服可作杏

仁煎

五癰煎

一名子芩五癰煎
幼幼新書

治小兒經熱癰體羸不堪兼治

子母

鉤藤皮

一分半

子芩

知母

各四分

甘草

五分

升

麻

三分

寒水石

六分

蚱蟬

二枚炙
去翅足

蜣螂

炒三
箇

沙參

龍齒

柴胡

各二分

蛇蛻皮

四寸
炙

右為末以清蜜和使流行銅器中置沸湯煎攪成飴

糖狀取之一月兒棗核大一呬二枚日再夜五六過

不甚妨食五十日兒呬三枚百日兒呬四枚二百三百日兒五枚一歲六枚三四歲七枚五歲十枚兼夜並六七過不妨食也

茯神散

幼幼新書

治小兒癇癎嘔吐

釣藤

獨活

黃芩

麻黃

去根

桂心

石膏

甘草

炙

防風

茯神

大黃

製各二分

蚱蟬

炙三枚

蛇蛻皮

炙三分

右以水三升煮取一升二合去滓一合日三服大小

增減服之

硝石丸

新書 幼幼

治少小痞癖結積除癰止驚

硝石

分三

柴胡

細辛

當歸

茯苓

芍藥

甘遂

分各二

大黃

分十

黃芩

巴豆

三十枚 去皮心炒

牛黃

研別

葶藶子

炒研各一分

右為末蜜丸一歲服胡豆大二九日一服以微利為度

牛黃雀屎丸

新書 幼幼

治小兒百二十癰諸變蒸腹中宿

痞及飲食不節腹滿溫壯朝輕夕甚大小便不通胃

氣弱脾冷使之

牛黃

芍藥

甘草

炙

巴豆

去心皮炒別入各三分

雀

屎白

炒

乾薑

當歸

黃芩

各二分

大黃

五分

芎藭

人參

各四分

黃耆

一分

麴

炒一合

右為末蜜丸胡豆大一歲兒未食與二九三二歲小
豆大二九日三不知稍加之微利為度常服大良初
生兒及二日五日已上腹中滿口急不得取乳大小
便不通兒胃中作聲者服半黍大一九十日兒一黍

大一丸若頭身發熱惕惕驚不安腹脹滿中中容忤
吐乳皆主之百日兒二丸及寒熱往來朝夕溫壯或
身體熱利久不斷青黃五色又已發癰目睛時上翻
或但直視或通夜轉急不得須臾息及傷寒食飲不
消化吐逆皆主之小兒有耐藥者酌加之量兒大小
服之無不瘥也

五癰丸 治小五癰驚悸狂叫發搐上盛涎潮等疾及
尋常涎盛

皂角

去皮搥碎水三四升浸取汁濾過銀器重湯熬成膏

白礬

熬苦研細各四兩

半夏

洗七次

上等辰砂

研

天南星

炮各一兩

蝎稍

炒

白礬

白殭蠶

直者炒

上等雄黃

研

白附

子

各半兩

麝香

研

烏蛇

酒浸去骨焙乾炒各一兩

蜈蚣

大者

一條去頭
足酒浸炙

右為末先用皂角膏子和未能就次用生薑汁煮糊為丸硃砂為衣小兒六七歲如菉豆大每服三四十粒三四歲二三十粒二四歲如麻子大一二十粒並

用薄荷湯下生薑湯下亦得

陽癰防風散

一名硃砂散

治小兒身熱面赤急驚風痰涎

壅盛上視牙關緊硬者陽癰也

硃砂

一分研

膩粉

麝香

各半錢

蘆薈

白附子

甘草

各二錢

胡黃連

一錢

蝎稍

七箇

白殭蠶

十箇炒

金箔

七片

赤脚蜈蚣

一條炒

右為末二歲已上服半錢七以金銀薄荷湯調下三

歲以上一錢七如口不開灌入鼻中一方無蝎稍

陰癇附子散

治小兒吐瀉或口吐不瀉日漸困面色

白脾虛或冷不搐搦目微上視陰癇慢驚也服此祛風豁痰回陽正胃及治唇青面黑四肢逆冷

黑附子

生去皮臍

生天南星

半夏

各二錢

白附子

一錢半

右研細井花水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂二錢麝一錢拌勻每一字薄荷湯調下量兒加減一方用附子生去皮臍為末每服二錢以水一盞半生

薑二片煎至半盞分三二服量兒加減吐者入丁香
五箇煎至乳空時服或用水浸炊餅為丸如粟米大
每服二十粒亦可一方入全蝎末二錢

甘草湯

一名釣
藤湯

治小兒諸癰疔瘰癧吐舌

甘草

灸剉

釣藤

枯樓根

黃芩

去黑皮

獨活

去蘆

皮

桂心

去粗皮

芍藥

當歸

切焙

石膏

碎各半兩

蛇蛻

六寸
炙黃

麻黃

右麤搗篩三五歲兒每服一錢七水一盞煎至五分

去滓熱服日三隨大小加減

當歸湯 治小兒諸癰

當歸

焙切

龍骨

研各半分

甘草

炙三分

大黃

剉炒

芍

藥

細辛

乾薑

炮

石膏

碎

桂

去皮

青石脂

黃芩

右搗篩五歲兒每一錢水小盞入棗二枚同煎至五分去滓分溫二服日三服後瀉者加赤石脂一分若有熱驚者加黃芩去黑心半兩隨兒大小加減

化涎丸 治諸癰胞絡涎盛宜常服此藥

半夏

一兩生薑汁浸一宿

乾薑

炮

黃連

桂心

木香

四味各半兩

牛黃

一分別研

麝香

一分別研

硃砂

一兩研細水飛

巴豆

十枚去皮心膜炒令黃研細

右件為末次入研者藥一處拌勻滴水為丸黍米大每服三九至五九溫米飲或煎荊芥湯送下乳食後
蚱蟬湯 治小兒五十日發癰諸藥無效及初生百日
內發癰者

蚱蟬

去翅足
微炙

芍藥

各三分

釣藤

細辛

去苗
葉

黃芩

去黑
心

黃耆

剉

甘草

炙令赤
各半兩

牛黃

研

麝香

大黃

剉炒香一
兩一分

右搗篩入牛黃麝香拌勻每服半錢水半盞煎至三分去滓分溫二服連夜五六服隨兒大小加減

斷癰丸

治諸癰痰盛

皂角

盈尺者三錢去皮搗碎水三升
浸取汁漉過煨器內熬成膏

白礬

煨枯
研細

一兩

南星

溫紙炮
熟一兩

蝎梢

炒

直僵蠶

炒

雄

黃研

硃砂

白附子

各半兩

麝香

一錢別研

烏蛇

酒浸取肉焙乾炒一分

赤蜈蚣

一條去頭足酒浸炙

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏為丸桐子大每服一九生薑湯下一方無麝香

全蝎五癩丸

赤蜈蚣

二條去頭足酒浸炙

南星

炮熟二錢半

麝

一字

全蝎

防風

硃砂

細研

遠志肉

薑汁浸炒

白附子

生

蘆

蒼延胡索

金銀箔

各三十片

右為末入麝糕糊丸桐子大每服一九菖蒲紫蘇煎湯調下

金朱丹 定一切癰

赤蜈蚣

大者一條去頭足酒浸炙

烏蛇頭

酒浸炙取肉

延胡索

生各一錢半

白附子

遠志

薑汁浸一宿

鐵粉

透明

防風

全蝎

焙

天麻

各一錢

金銀箔

各三十片

天

南星

二錢半薑汁浸一宿

右為末以圓白半夏為稠糊入黃牛膽汁并腦麝少

許和丸 桐子大 硃砂為衣 每服二丸 金銀器煎湯泡
薄荷調下

麝香雙丸 治新生兒客忤中惡癇發乳哺不消中風
反折噤口吐舌并吐忤面青目下垂腹滿身體羸瘦
脛交三歲不能行者

麝香 牛黃 黃連

各二兩

桂心

蜈蚣

一箇去頭足

雄黃 硃砂 烏賊魚骨

炙

附子

炮

巴豆

十六

枚去皮炒

特生礬石

燒煉半日各一兩

右別研巴豆如脂和末勻蜜和杵三千下甕合收勿泄氣十日至一月兒服一米百日至三百日兒服二麻子許以意增減兒雖小病甚者增大其圓不必依此小兒病率多耐藥服當汗出若不汗及不覺瘥一日一夜四五服以汗出及瘥為限嬰兒見生人即為客忤婦人月水來未盡觸小兒亦為客忤若多失子產下輒死者但落地啼聲未絕便以指刮舌上當時銜血如殓藥者便與米大二兒一日一服七日乃

止無不全也藥不能全合半劑者當用巴豆三十箇若三分合一者巴豆二十七箇亦不隨餘藥減其然者正以此為良爾若無赤頭足蜈蚣只取足赤者三條斷其頭并項後二節用之其餘不堪用也

鐵精丸 治少小心氣虛或以發癰及未發安五臟定心氣

鐵精 黃芩 芍藥 芫花 炒 人參 甘遂 炙

茯神 各三分 硝石 牛黃 各二分 蛇蛻皮 二寸 甘

草

一分

右為末蜜為丸小豆大一服三九日再不止加之取

微利為度

至寶丹 治諸癰急驚卒中客忤不得睡煩躁風涎搐

搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並皆服之

安息香

一兩半為末無灰酒飛過濾出沙石約取一兩慢成膏入藥內用

琥珀

研

硃砂

雄黃

各一兩
研水飛

金箔

五十片

銀箔

五十片

片

龍腦

麝香

各六分

牛黃

半兩
各研

生烏犀角

生玳瑁屑

右生犀玳瑁搗羅為細末研入餘藥合勻將安息香以重湯凝成膏搜為劑如乾即入少熟蜜盛不津器中旋丸如梧桐子大一歲服二丸人參湯化下大小以意加減治大人中風語中惡氣絕中諸物毒中熱暗風產後血暈死胎不下並用童子小便一合生薑自然汁三五滴同溫過化下五丸立效

龍膽湯

治嬰兒出腹血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣

發熱大吐嘔者及雖能哺食中實不消壯熱變蒸
中客人鬼氣并諸驚癇方悉主之十歲以下小兒
皆得服之但新生嬰兒及漸長者其服藥多寡俱
依後例若必知客忤及有鬼氣者可加人參當歸各
如龍膽多少也一百日兒加三銖三百日兒加六銖
一歲兒加半兩餘藥皆準耳

龍膽 鈞藤皮 柴胡 黃芩 桔梗 芍藥

茯苓

一作
茯神

甘草

各六
銖

蜚蠊

二
枚

大黃

右咬咀以水一升煮取五合為劑服之如後節度兒
有虛實兒虛宜減藥與水也小兒生一日至七日分
一合為三服兒生八日至十五日分合半為三服兒
生十六日至二十日分二合為三服兒生二十日至
三十日分三合為三服兒生三十日至四十日盡以
五合為三服皆得下即止勿再服之

神明還命牛黃丸 治小兒癇

牛黃

豆許 二大

白石脂

龍骨

各一兩半

桂心

寒水

石大黃

各二兩半

牡蠣

蘇蘇

各二兩

石膏

碎

硝石

各三兩

右為末水二升三指撮末煮五合為三服日三牛黃為末臨時入

地龍散 治諸癰發歇無時

乾地龍

半兩焙

虎睛

一對炙

人參

一分

金銀箔

二十

片

天竺黃

硃砂

代赭石

煨醋碎

鐵粉

各一分

雄黃

一錢半

輕粉

半錢一用鉛霜

右為末每服半錢紫蘇湯調或溫水調下

白朮湯 治少小腹中有熱有寒在胃上逆吐腹雷鳴而滿驚啼甚即發癰掣縮休作有時

白朮

當歸

各一兩

厚朴

炙

半夏

洗

甘草

炙

人參

川芎

生薑

各二兩

枳實

三箇炙

食茱萸

合二

右以水七升煮取二升溫服三合日三夜二合

羌活膏

治三十六種驚風三發成癰

羌活 人參

桂心

防風

各半錢

蝎

硃砂

硫黃 茯苓

木香

各一錢

腦麝

各少許

右為末煉蜜為膏入金銀箔各十片衣研酌量加減

以薄荷湯下

扁金丹

治小兒胎風諸癇手足癱瘓目睛上視頸項

緊急強直或搖頭弄舌牙關緊急口吐痰沫反拗多時精神不寧睡卧多驚吐痢生風昏塞如醉

白花蛇

去骨酒浸焙乾秤

防風

去蘆頭焙乾秤

蜈蚣

要赤者不去頭

全用
炙

乳香

研極細
各半兩

蝎

要扁瘦
各半兩

硃砂

研極
細各

一兩

天南星

火燒
存性

大草烏頭

火燒
存性
一兩半

麝香

一錢
細研

牛黃

半錢
細研

右為細末然後與研者藥一處再研勻用水浸炊餅
為丸如桐子大捏扁每服三餅子荊芥湯化如稀糊
抹入口中漸漸嚥下候一時辰更進一服神效一方

無牛黃防風

天南星煎 凡胎癰病潮發遲速

天南星

一兩

白附子

一兩

白花蛇

一兩酒浸去皮骨炙令黃

乾蝎

半兩炒

天麻

半兩

已上搗羅為細末用好酒兩

大盞攪令勻於慢火上熬不住手攪以酒盡為度

次入

好硃砂

半兩水飛

膩粉

一分

牛黃

半錢

麝香

半錢

龍腦

半錢為末

右都入膏子內一處和看硬軟成膏如皂角子大每

服一粒竹瀝化下不計時候

治五癰

露蜂房

一兩焙
先洗

石菖蒲

桂心

遠志

去心

人

參

各半
兩

牛黃

杏仁

去皮

硃砂

各一分

麝香

一錢

研

右為末薄荷湯調下三歲以下半錢大小以意加減

人參丸

治小兒諸般驚惕癇瘕及中客忤

人參

半兩

甘草

炙三分

牛黃

細辛

去苗各半兩

蚱

蟬

去翅足
炙七枚

大黃

溫紙裹
煨半兩

芍藥

當歸

切焙
半兩

蛇蛻

炙三寸

括樓根

防風

去叉各半兩

麝香

巴

豆

去皮心研
三十粒

右除巴豆牛黃麝香外搗羅為末研勻煉蜜為丸如麻子大初生至百日兒每服二丸一歲至五歲兒每服三丸五丸並用薄荷湯下若兒驚惕及客忤溫壯發熱腹滿丸數服之以快利為度更量兒大小加減治小兒癇

茯苓

牛黃

另細研入

龍齒

各二分

釣藤

芍藥

黃芩

各一分

甘草

半分炙

蚱蟬

二箇炙羽足去

竹瀝

合一

煮湯成
下之

右以東流水二斗銀器中煮金銀各十兩分五升汁
煎藥取一升半間乳細細與服此治未出月兒若大
者加少藥

蚬蚬丸 治四十八候癰

全蝎 半夏 京墨 煨各半錢 辰砂 鐵粉 人參

真珠 未各一錢 好茶 半錢 春柳芽 半錢乾者或一錢

右為末酒糊丸如菜子大每服七粒至十粒薄荷湯

下一日三服一月見效

人參茯神湯 治諸癰心神不定

人參

茯神

剉各一兩

白鮮皮

半兩

羚羊角末

甘

草

炙

天竹黃

各一分

酸棗仁

天門冬

去心各半兩

右為細末每服一錢水八分入生薑薄荷各少許煎

四分去滓溫服

麻黃湯 治小兒六七歲發癰壯熱

麻黃

去根一兩一分

釣藤皮

一兩

芍藥

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麴

炒

桂心

皮去

當歸

焙切

秦朮

去苗土
各三分

石膏

兩一

半研

右搗篩每一錢水一盞煎至五分去滓分溫二服日

三服隨兒大小加減

定癰丸 治小兒五癰

赤蜈蚣

一箇去頭
足酒浸炙

蝎稍

白附子

生

烏蛇肉

酒浸

天南星

末

圓白半夏

未用薑汁浸
一宿各一分

熊膽

白礬

新瓦煨枯
各半分

右為末稀麵糊丸桐子大硃砂為衣每服一九薄荷湯調下

龍齒散 療小兒癇疾

茯苓 龍齒 各二分 釣藤 芍藥 黃芩 各一分

甘草 半分 蚱蟬 二枚去翅足炙 牛黃 二大豆許

右搗研細末入竹瀝一合研候湯欲成下以東流水二斗銀器煮金銀各十兩取五升入藥煎取一升半間乳細細與服此療未出月小兒大即加藥

蛇蛻湯 治小兒百日病風癇驚熱

蛇蛻皮

三寸灸聖惠方用五寸

釣藤 黃耆 細辛 甘

草

灸各二分

大黃

四分

蚱蟬

去足四枚灸後去頭

牛黃

五大豆許

右以水二升半煮取一升一合百日小兒一服二合甚良外臺秘要療小小二十種癇病胃中病若窮地無藥不得牛黃少此味亦可然大黃不得闕

大黃膏 治小兒諸癇宜用固顙

川大黃

三分

雄黃

丹參

一方無升參用定粉

黃芩

各一分

生商陸

一兩

猪脂

一兩

雷丸

附子

生用去皮
臍各半兩

右搗碎以猪脂兑入鍋中以文武火熬令鎔綿瀘過
然後下藥藥煎令七上七下去滓細碎研雄黃下膏
中攪令至凝於甕器中盛每服少許熱炙手摩兒顙
各掌中背脇皆使遍訖以蛤粉粉之

曾青湯 治少小二十五癩日數百發者治之無不差

曾青 甘草

炙二分

當歸

細辛

芍藥

獨活

大黃 麻黃

去節各
三分

右水三升煮取七合一月兒服如杏核二月二杏核
大小以此為準服訖要當抱兒令汗出若先下者勿
令汗出若自汗出去麻黃加麻黃根一分若腹中急
痛加當歸芍藥一分若縮口聚唾舐乳者加細辛一
分中風身強戴眼反折者加獨活一分要當消息視
其所苦依病增減藥皆令精新或分五服日三夜二
小有癰候便可作無病候亦可服令兒終身不病癰
日中數百發者此湯治之無不瘥也

玉癰丹 治諸癰候潮搖正發未分

黑錫

一兩

蝎梢

半夏

湯洗十遍

天南星

炮製

防風

木香

人參

去蘆頭

白殭蠶

炒黃各半兩

右為細末次用水銀半兩同石腦油半盞研極細入麝香一錢龍腦半錢同研細與諸藥拌勻棗肉如黍米大每服七粒至十粒煎荊芥薄荷湯下不拘時候

露蜂房散

治五種癰候手足抽掣口吐涎沫

露蜂房

洗淨焙乾

石菖蒲

一寸九節者各三兩

桂心

遠志

人參

去蘆頭
各半兩

已上搗羅為細末次用

硃砂

牛黃

各細
研

杏仁

湯洗麥炒去皮
尖別研各一分

右同諸藥拌勻每服半錢麝香調下

南星丸

治一切癰

南星

一箇一兩中開一穴用辰砂半兩以好酒調
末入內塞之掘一地穴火煨之令通紅又南

星入於好酒內以蓋覆定
不得通風臨冷取出為末

全蝎

四十九
箇炒

右為末研勻以薑汁調為丸如紫豆大每服十九麝

香酒調下汗出為度

治諸癰

取鯉魚脂食之良

釣藤飲 治小兒吐痢發癰病吐舌掣縮

釣藤 黃芩

去黑心

甘草

各半兩炙

石膏

碎

龍腦

各一兩

升麻

三分

蚱蟬

去翅足炙一枚

右搗篩每一錢以水七分入竹葉三片同煎取四分

去滓分溫三服至夜令盡七歲全劑三四歲只半劑

雷丸膏 治小兒癰及百病傷寒

雷丸

分一

甘草

芥草

川升麻

防風

一兩去蘆五分

桔梗

白朮

右為末以脂膏一片先入鍋慢火煎令鎔後下藥末以柳枝不住手攪成膏綿濾入甕合盛之每有患者摩其頂及背上不用針灸只用此膏小兒癩及腹中病熱摩腹待乾粉之立愈

寧眠散

治搖搦不得安卧成癇

天南星

炮製

人參

去蘆頭

白附子

炮各半兩

乳香

血竭

各一錢

乾蝎

二十一箇生用

乾赤蜈蚣

一條酒酥炙黃

右諸藥拌勻為末每服一字至半錢用好酒少許浸薄荷煎湯調下每兒搗服之得眠是驗次用辰砂膏方相兼服之

鐵彈丸 治一切驚癇

五靈脂

四兩

川烏頭

二兩去皮

生烏犀

乳香 沒

藥

一兩

牛黃

麝香

一分

右為末臘月重午日人不語打井花水和丸如彈子

大合時忌見雞犬婦人收起藥方得語用時研破荊芥湯下一丸

珍珠丸 治小兒虛中積熱驚癇等候

巴豆霜 膩粉 錢各二 滑石 錢三 天南星 粉霜

錢各一 蝎稍 續隨子 去皮二
十四箇

右為末以糯粥丸如黃米大小兒二歲以下每服三丸至五丸十五歲每服五丸至十九茶湯下荊芥湯亦可量虛實加減

銀硃丹 治諸癰昏困涎盛

乾蝸

一分

天漿子

一分炒

露蜂房

一分炒

已上三

味為細末次用

硃砂

半兩水飛

水銀

一分用黑鉛一分同研炒

牛黃

一錢研

麝香

一錢

右都一處拌勻研細用白麵糊和如黍米大每服五粒煎金銀薄荷湯下乳後

大驚丸

一名罷驚丸

治驚風諸癰壯熱昏憤神志恍惚痰

涎壅塞或發搐搦目睛直視並皆治之

硃砂

研飛
三錢

青礞石

研一
錢

蛇黃

蝦醋碎九次
研飛二錢

蝦蟆灰

雄黃

各一
錢半

錢粉

研二
錢半

右研勻以水浸蒸餅丸如桐子大每服一九煎薄荷湯磨刀股水化下日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒腑臟口齒腸胃柔弱丸用水銀粉藥切須慎之則無他苦

太乙散 治胎癇正發未分癎後亦宜常服亦治急慢驚風發搐不定

天漿子

微炒

蝎梢

各二十箇

防風

天麻

硃砂

各五錢

麝香

一錢

右為細末乳汁調下不拘時候加減服

牛黃散 治小兒五種癇手足動搖眼目反視口吐涎沫心神喜驚身體壯熱

牛黃

研

丹砂

研

白欬

露蜂房

微炒

杏仁

湯浸

去皮尖雙仁麋炒黃各一分

桂心

去皮半兩

右搗研為散每服乳汁調下一字七日四五服量兒

大小加減

蛇黃丸 治諸癰

蛇黃

一箇煨醋淬
七八次細研

鬱金

雄黃

各二錢

鐵粉

篩淨

研細
一錢

青礞石

硃砂

各一錢

右為末粳米飯九桐子大每一丸人參煎湯調下

當歸大黃湯

治諸癰壯熱利下心中惡血

大黃

濕紙裹
畧煨

甘草

炙

當歸

赤芍藥

各二分

半夏

製

川芎

各一錢半

右為末每服三字薑棗服

茵陳湯

治小兒發癰經日不解諸治不瘥口焦面赤

黑胃中有熱

茵陳 大黃 黃芩

各四分

黃連 硝石

無以芒硝代

甘草

各炙二分

右水三升煮取一升二合內硝石洋盡為三服

釣藤飲子 治諸癰啼呌者

釣藤

蟬殼

各半兩

黃連

揀淨

甘草

川大黃

微炮

天竺黃

各一兩

右搗羅為末每服半錢至一錢水八分盞入生薑薄
荷各少許煎至四分去滓溫服

麝香膏 治胎癰不得安卧

麝香

一分

牛黃

一分研

全蝎

二十一分筒取末

白附子

一分

取末

蠶蛾

一分炒為末

白殭蟬

一分炒取末

右都拌勻研細煉蜜為和膏如皂子大每服一粒煎
人參荊芥湯下

犀角散 治小兒百日已往至三四歲肝心氣熱發癇
連癇身體如火

犀角屑 鈎藤 黃芩 川升麻 各一兩 麥門冬

一兩半
去心焙 龍齒 二兩

右件藥搗羅為末每服一錢用水一小盞入竹葉七
片煎至五分去滓量兒大小加減溫服

丹參赤膏 治少小心腹熱除熱方

丹參 雷丸 芒硝 戎鹽 大黃 各二兩

右咬咀以苦酒半升浸四種一宿以成煉猪肪一片煎三上上三下去滓乃芒硝膏以摩心下冬夏可用一方但用丹砂雷九亦佳

龍膽湯 治小兒諸癰寒熱吐痢不能乳哺

龍膽草 當歸

焙切

大黃

剉炒

黃芩

去黑心

栝樓

根 甘草

炙

桂心

去粗皮

人參

切

麻黃

去根節

牡蠣

熬

赤石脂

研

芍藥

各一兩

右麝搗篩二三歲兒每一錢匕水一盞棗一枚擘同

煎至五分去滓分溫二服更量兒大小加減

祛風墜涎丸 治小兒諸癰

荊芥穗

蜜陀僧

白礬

生各半兩

半夏

一兩湯洗

硃

砂

一錢為衣

右為細末水糊丸如黍米大硃砂為衣每服三十丸
荊芥湯下乳後

黃芩丸 治小兒諸般癰疾口出白沫

黃芩

去黑心

梔子仁

犀角

鎊各一兩

麝香

研一錢

虎睛

研一
隻

右為末研細煉蜜和丸如菉豆每服一歲至二歲兒
三九三歲至五歲兒五九並米飲下日四服更量大

小加減

雄黃丸

一名五
癩丸

治小兒五種癩牛癩即牛聲馬癩即

馬嘶狗癩即狗吠羊癩即羊鳴雞癩則雞鳴五癩病
者腑臟相引邪氣盈起寒厥不識人手顫口吐沫須臾
如甦復作神效

雄黃

研

水銀

各二兩

鉛

熬成汁與水銀結作沙子三兩

真珠

末

一細研兩

丹砂

研半兩

右為細末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸金銀薄荷湯下日再服錢氏名五色丸一方有金銀箔用猪心血為丸

鐵精丸

治初得癰雖時時發先服鉛丹丸後服此方

鉛丹丸方見癰瘡復發門中百病鉛丹丸

鐵精

一兩研

石膏

甘草

灸各二分

當歸

二分

麝香

分半

右為末蜜丸如小豆大一服二九日服三服

鐵粉丹 治諸癰胃膈不利

鐵粉

一兩
研

乾蟾

一枚生薑汁浸
炒炙焦黃為末

乾蝎

七箇
為末

硃砂

半兩細
研水飛

牛黃

一分
研

右都拌勻糯米飲和如黍米大每服三粒至五粒煎人參湯下

五星丸 治暗風癰疾取涎積倒地不知人事此方神

效取下病積

白丁香 赤小豆

各三
十箇

乳香

一分

輕粉

半錢
重

巴豆

一十四箇
去油用

右末滴水為丸分作十一丸每服一丸米半盞磨化
下臨發時服取下積涎如青黑色是應如十年內此
一服便瘥更無再作已上者半月日再一服永除次
服硃砂鎮心藥

全蝎散

治證同前本類八味扁金丹

全蝎

半兩

白附子

硃砂

別研
三錢

白殭蠶

二錢

麝

香

一錢
別研

右為細末每服半錢荊芥湯入酒少許用調服

神效丹

治小兒諸癰服絕根極有神效大人亦可用

猪牙皂角

不蛀者四兩重粗剉用羯羊肝一箇切作片子用水三大碗煮數十沸去肝用

皂角

半夏

揀大而陳者四兩重用薑汁浸三宿漉去曬乾每箇切作四片生硃末一兩同

於鐵銚內同炒以半夏黃為度揀出半夏生硃末別研入藥

天南星

二兩重
生用

白礬

明者二兩重
畧枯存性

黑牽牛

二兩重
炒紫色

右為細末就用生薑汁打糊為丸如黍米大每服三十丸至四十丸生薑湯下

釣藤飲 治小兒發癇時時戴眼口中沫出此是癇疾並宜服之

釣藤

二分剉

人參

黃芩

去黑心

蚱蟬

一枚去翅足炒

大黃

剉炒各半兩

牛黃

三豆大別研湯成下

右搗篩每服三錢匕以水一盞竹瀝三合煎取五七分去滓入牛黃少許溫服若得微微瀉利一兩度即

止乳母忌蒜麵炙煨物

白金散 治諸癰潮發不省者

好白殭蠶

半兩揀治淨湯洗炒散黃色搗羅為細末用

天竺黃

一分細研

真牛黃

錢一

麝香

龍腦

各半錢

右件同拌勻每服半錢用生薑自然汁調放溫灌之

祛風散 治胎癰多啼叫

胡黃連

半兩取末

全蝎

一分為末

犀角

一分屑取末

天竺

黃

一分研

麻黃

一分去節為末

右都研令勻細每服半錢研入麝香一字乳汁調下

獨活湯

治小兒發癇手足掣癡十指戰掉舌本強腫

獨活

去蘆頭

人參

各半兩

大黃

剉炒二兩

麻黃

去節水煮

去末二分

右搗篩一二歲兒每服半錢水半小盞煎至三分去

滓溫服連夜三四服隨兒大小加減大有神效

治小兒癇

以枯蟬燒灰服之

即蟬蛻

治小兒癰

以馬御煮汁服

萬病湯 治小兒癰

當歸 細辛 礬石

燒

甘草

炙各一兩

右以水四升煮取一升去滓內白蜜鷄子大分為五服當日令盡

大黃湯 治少小衆癰乳哺不時發溫壯吐利驚悸胎寒腹痛一十五癰

大黃

四分

芍藥

當歸

甘草

炙各二分

右以水三升煮取一升去滓一月兒服一杏核許日
三服百日兒二杏核大小以此為率若發熱加麻黃
二分去節有毒切之先煮數沸沫內諸藥若反折
戴眼掣縮者加細辛四分若乳哺不消壯熱有實者
增大黃令倍諸藥不爾等分大黃刀劈破勿令有碎
末無其疾不須增益兒有大小強弱以意增減一方
諸藥等分兒不痢者減大黃三分之一服湯令母抱之

令小汗出病甚者令大汗出畢溫粉粉之下痢者勿
令出汗也日夜可四服兒夜啼有微熱口御乳若不
安皆可服一方治下粗篩盛以韋囊欲合小劑水一
升半煮三指撮藥內湯中更三沸令得六合絞出滓
服之皆當取真新藥方可用也小兒氣弱惡藥不精
非但無益乃更損兒可不慎乎此方屢試有驗王汝
南方又戴眼中風身體常強增獨活二分大炒便是
葛氏時後及元和經四味飲子但分兩不同及又有

加減藥爾肘後與元和經方已收溫壯門中

茯苓釣藤湯 治少小七日以後患癰

釣藤

茯苓

各二分

甘草

炙

大黃

煨各一分

右水一升煮去三合為五服當大驗

勝金丸 治因驚過發瘡或但知受風熱未洗除心臟

積熱雍毒雖設湯散療治日久不退至熱過涎生膈
上壅塞心胃氣亂交橫變生癰疾其候發來一日數
次變候轉頻吐瀉氣弱未曾補治

腦麝 蘆薈 牛黃 胡黃連

末

右等分研細熊膽汁為丸菜豆子大每服三九米泔水研下

療卒得癰

用蚯蚓七箇自死者取置新竹筒內水一升並蚯蚓炭火內煨水沸消盡蚯蚓去滓澄清每發即飲之不過三兩度立瘥餘當令諸兒服之皆驗也

聖星丹 治諸癰皆宜服之曾經大效

天南星

揀四十九箇一般大者五月五日取活蝎四十九箇用瓦器盛以鹽泥固濟吊于淨

室中至臘日取出揀天南星蝎螫着處有小竅子者其餘不用只將蝎螫天南星以酒浸一宿焙乾

碾為細末次用

好辰州硃砂

五分細研水飛

真牛黃 麝香

龍腦

各一錢

右一處研拌勻用生薑汁和如梧桐子大每服一粒至二粒煎人參薄荷湯化下神驗

青芝散 乳母服之

青黛

二錢別研

藍實

三兩

白芝麻

九兩生用

右為末入青黛令勻每服三錢沸湯點服食後日二服常服甚效

蚱蟬散 治小兒初生百日内發癰

蚱蟬

煨

赤芍藥

各三分

黃芩

二分

右為末每服水一小盞煎至五分去滓服

吐涎散 治時發驚風變成癰疾

膩粉

一兩

猪牙皂角末

一分

右研令勻每服半錢生油一椀蚪水半盞同調勻分

二服以吐為度

保安丸 治諸風癰久遠亦驗

川烏

生去皮尖
二錢半

五靈脂

半兩

右為末猪心血丸如桐子大每一丸薑汁泡湯調下

星硃散 定癰利痰

南星

濕紙炮香
熟一兩

硃砂

一錢

右為末用帶性猪心血為丸桐子大每服一丸煎防

風湯調下

雄硃散 治諸癰口眼相引上視涎流手足抽掣頭項

反張腰背強直

雄黃 硃砂

等分

右為末每一錢猪心血夾蘆水調下

治卒得癰

鉤藤 甘草

炙

右各二分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三

開關散 治嬰孩小兒驚風癰疾喉閉牙關緊急

蟾酥

一小片

鉛白霜

一字

右同研令極細用烏梅肉蘸藥入口兩角楷之良久

便開如不開即用歸魂散一字許吹入鼻中

方見驚癇忤是

三候門中

候嚏噴即關開便下歸魂散一服如驚風癇再

發須進睡紅散三服

方見急慢驚風門中

後下調胃氣藥看詳

用之

猪心湯 治五癇顛癇及婦人心風血邪神效

甘遂

末一錢

右用帶性猪心一箇取三管頭三條和甘遂末如血
多只隨藥末得中和之將猪心批作兩片將所和藥
入在內再合用綿縛定外以濕紙包慢火內煨熟不
可過度取出去紙取甘遂研細次入硃砂末半錢和
之分作四丸每服一丸以所煨猪心煎湯調下後別
用猪心煎湯重者只守本方輕者加以蘇合香丸一
粒准過半日不動又進一服如大便已下惡物即止
後劑急與醒脾散以助胃氣

治小兒癰疾

右取牡鼠一枚取腹大貪食者以黃泥裹燒之細揀去骨皮取肉和五味汁作羹與食之勿令食着骨甚瘦人

治小兒一百二十種驚癰寒熱腸痔蠱毒諸墮惡瘡安胎去邪明目

右取蛇蛻皮熬用之

治小兒卒得癰

右用蜂房大者一枚水二斗煮令濃亦以浴小兒日三四佳效

萬金牛黃丸 治小兒諸癰驚惕瘕及中客忤

牛黃研細 熊膽 人參 細辛 赤芍藥 當歸

微炒 藟藟根 防風 去苗各半兩 川大黃 微炒 蚱

蟬 一枚去翅足炙 蛇蛻皮 五寸炙令黃色 麝香 一分研入 甘草

三分 巴豆 三十枚去皮心研如膏

右為末入巴豆研勻煉蜜和杵丸如麻子大每初生

一月至百日服一九一歲至三歲服二九四歲至五歲服三九並用薄荷湯下快利為度

犀角湯 退癰鎮心神

犀角

屑一兩

茯苓

細剉

麥門冬

去心焙乾

人參

去蘆頭

甘草

炙

黃芩

各半兩

右為散每服一錢以水八分入生地黃汁少許同煎至四分去滓溫服

治小兒癰

右用鱉甲炙令黃搗為末取一錢乳服亦可蜜丸如
紫豆大服之

治小兒卒得癇疾

右用白犬血一棗許含之又塗身上

本草治小兒癇

右用烏鴉一枚臘月者入瓦餅泥煨燒為炭飲下

治小兒癇

右用刮青竹茹三兩醋三升煎一升去滓服一合兼

治小兒口噤體熱病一方只用竹瀝一合溫與兒服之

又方

右用水銀小豆許安一甕中沉湯煮之一食久服時勿大仰兒頭恐入腦亦可以壓一切熱矣近世多不煮只以紙裂過服

治小兒癰方

右用將馬絆繩煮洗兒

煎金飲

一名代赭石散

治小兒不拘陰陽證發癇者並治之

右用以代赭石為細末水飛極細日乾每服半錢或一錢用真金煎湯調下連進三服見兒脚脛上有斑赤色即是邪氣已出兒當安無斑赤出者不可治此藥本出保生方用之無效自後加麝香金箔同研細酒調連進三服用之有效鐵漿治癇癲發熱鎮心並六畜癇古鏡煎湯治驚癇邪氣中諸毒用好墨磨汁服卒中客忤其狀與癇一同眼睛下視鐵屑煎湯治

驚邪癩癰客忤消食逐冷氣

法煉靈烏散 治小兒胎風諸癰目睛邪視涎潮壅噎

吐嚥不下口眼牽引身體強直

烏鴉

一隻臘月者良
留毛去腸肚

硃砂

鐵粉

蛇黃

燒紅
淬三

次各
半兩

黑鉛

半兩鎔成汁入水銀半兩
在內炒成砂傾出待冷用

黃丹

二錢

半

已上除烏鴉外並研細入在烏鴉腹內用線

縫合入甕罐內以鹽泥固濟日中曬乾用炭火三

觔煨煙出為度次入下項藥

天南星

生薑汁浸
三宿焙乾

防風

去蘆頭

羌活

去蘆頭

川芎

四味各一兩

荊芥穗


全蝎

去毒微炒

白殭蠶

炒去絲嘴各半兩

右件為細末與藥同研勻每服半錢麝香湯調下不拘時候



普濟方卷三百七十六

謹案卷三百七十六第二十頁後三行特生舉石

原本特訛時據本草綱目改

[illegible]